

No	レジメン名	薬剤名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間 (週)	催吐リスク	適応分類
782	BV (子宮頸部)	アバスチン	ベバシズマブ (遺伝子組換え)	15	mg/kg	30-90分	day1	点滴静注	3	最小度	進行・再発
236	CDDP(CCRT/子宮頸部)	シスプラチン	シスプラチン	20-40	mg/m ²	1時間	day1	点滴静注	1	高度	放射線化学療法
882	CPT-11	イリノテカン	イリノテカン塩酸塩水和物	100	mg/m ²	90分	day1.8.15	点滴静注	4	中等度	進行・再発
726	TC (子宮頸部)	パクリタキセル カルボプラチン	パクリタキセル カルボプラチン	175 6	mg/m ² AUC	3時間 1時間	day1 day1	点滴静注 点滴静注	3	軽度 中等度	進行・再発
750	TC+BV (子宮頸部)	パクリタキセル カルボプラチン アバスチン	パクリタキセル カルボプラチン ベバシズマブ (遺伝子組換え)	175 5 15	mg/m ² AUC mg/kg	3時間 1時間 90分	day1 day1 day1	点滴静注 点滴静注 点滴静注	3	軽度 中等度 最小度	進行・再発
847	Topotecan+CDDP	ハイカムチン シスプラチン	ノギテカン塩酸塩 シスプラチン	0.75 50	mg/m ² mg/m ²	30分 1時間	day1-3 day1	点滴静注 点滴静注	3	軽度 高度	進行・再発
886	Topotecan+PTX	パクリタキセル ハイカムチン	パクリタキセル ノギテカン塩酸塩	175~180 0.75	mg/m ² mg/m ²	3時間 30分	day1 day1-3	点滴静注 点滴静注	3	軽度 軽度	進行・再発
887	Topotecan+PTX+BV	パクリタキセル ハイカムチン アバスチン	パクリタキセル ノギテカン塩酸塩 ベバシズマブ (遺伝子組換え)	175~180 0.75 15	mg/m ² mg/m ² mg/kg	3時間 30分 30-90分	day1 day1-3 day1	点滴静注 点滴静注 点滴静注	3	軽度 軽度 最小度	進行・再発
702	TP	パクリタキセル シスプラチン	パクリタキセル シスプラチン	175 75	mg/m ² mg/m ²	3時間 1時間	day1 day1	点滴静注 点滴静注	3-4	軽度 高度	術前 術後 進行・再発
749	TP+BV	パクリタキセル シスプラチン アバスチン	パクリタキセル シスプラチン ベバシズマブ (遺伝子組換え)	175 50 15	mg/m ² mg/m ² mg/kg	3時間 1時間 90分	day1 day1 day1	点滴静注 点滴静注 点滴静注	3	軽度 高度 最小度	術前 術後 進行・再発