

No	レジメン名	薬剤名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間	催吐リスク	適応分類
707	5-FU+NDP	5-F U アクトラ	フルオロウラシル ネダプラチン	800	mg/m ²	24時間	day1-5	点滴静注	4週	軽度	進行・再発
				90	mg/m ²	90分	day1	点滴静注		中等度	
677	5-FU+NDP+RT	5-F U アクトラ	フルオロウラシル ネダプラチン	500	mg/body	24時間	day1-5,day8-12,day15-19,day22-26,day29-33,day36-40	点滴静注	6週	軽度	進行・再発
				10	mg/body	30分	day1-5,day8-12,day15-19,day22-26,day29-33,day36-40	点滴静注		中等度	
708	DCF (NAC)	5-F U ドセタキセル シスプラチン	フルオロウラシル ドセタキセル シスプラチン	750	mg/m ²	24時間	day1-5	点滴静注	3週	軽度	術前
				70	mg/m ²	1時間	day1	点滴静注		軽度	
				70	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注		高度	
164	DTX	ドセタキセル	ドセタキセル水和物	70	mg/m ²	90分	day1	点滴静注	3週	軽度	進行・再発
945	FOLFOX+RT	エルブラット レボホリナート 5-F U 5-F U	オキサリプラチン レボホリナートカルシウム フルオロウラシル フルオロウラシル	85	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注	2週	中等度	進行・再発
				200	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注		軽度	
				400	mg/m ²	急速	day1	点滴静注			
				1600	mg/m ²	46時間 (5ml/hr)	day1-2	点滴静注		軽度	
111	FP (standard)	5-F U シスプラチン	フルオロウラシル シスプラチン	800	mg/m ²	24時間	day1-5	点滴静注	4週	軽度	進行・再発
				80	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注		高度	
193	FP (standard) + RT	シスプラチン 5-F U	シスプラチン フルオロウラシル	70	mg/m ²	2時間	day1,29	点滴静注	6週	高度	放射線化学療法
				700	mg/m ²	24時間	day1-4,29-32	点滴静注		軽度	
917	mFOLFOX6	エルブラット レボホリナート 5-F U 5-F U	オキサリプラチン レボホリナートカルシウム フルオロウラシル フルオロウラシル	85	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注	2週	中等度	進行・再発
				200	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注		軽度	
				400	mg/m ²	急速	day1	点滴静注			
				2400	mg/m ²	46時間 (5ml/hr)	day1-2	点滴静注		軽度	
864	Nivolumab(q2W)	オプジーボ	ニボルマブ (遺伝子組換え)	240	mg/body	1時間	day1	点滴静注	2週	最小度	進行・再発
914	Nivolumab(q 4 W)	オプジーボ	ニボルマブ (遺伝子組換え)	480	mg/body	1時間	day1	点滴静注	4週	最小度	進行・再発
1052	FP+Nivolumab (食道)	5-F U シスプラチン オプジーボ	フルオロウラシル シスプラチン ニボルマブ (遺伝子組換え)	800	mg/m ²	24時間	day1-5	点滴静注	4	軽度	進行・再発
				80	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注		高度	
				480	mg/body	30分	day1	点滴静注		最小度	
975	FP+Pembrolizumab (食道)	5-F U シスプラチン キイトルーダ	フルオロウラシル シスプラチン ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	800	mg/m ²	24時間	day1-5	点滴静注	3	軽度	進行・再発
				80	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注		高度	
				200	mg/body	30分	day1	点滴静注		最小度	
1020	Nivolumab(q2W) +Ipilimumab (食道)	オプジーボ	ニボルマブ (遺伝子組換え)	240	mg/body	30分	day1.15.29	点滴静注	6	最小度	進行・再発

		ヤーボイ	イビリムマブ (遺伝子組換え)	1	mg/kg	30分	day1	点滴静注		最小度	
1021	Nivolumab(q3W) +Ipilimumab (食道)	オプジーボ	ニボルマブ (遺伝子組換え)	360	mg/body	30分	day1.22	点滴静注	6	最小度	進行・再発
		ヤーボイ	イビリムマブ (遺伝子組換え)	1	mg/kg	30分	day1	点滴静注		最小度	
960	Pembrolizumab (q3W/食道)	キイトルーダ	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	200	mg/body	30分	day1	点滴静注	3	最小度	進行・再発
961	Pembrolizumab (q6W/食道)	キイトルーダ	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	400	mg/body	30分	day1	点滴静注	6	最小度	進行・再発
927	PTX (weekly/食道)	パクリタキセル	パクリタキセル	100	mg/m2	1時間	day1.8.15.22.29.36	点滴静注	7	軽度	進行・再発