

No	レジメン名	薬剤名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間	催吐リスク	適応分類
214	CBDCA + GEM(中皮腫)	ゲムシタビン	ゲムシタビン塩酸塩	1000	mg/m ²	30分	day1,8	点滴静注	3週	軽度	進行・再発
		カルボプラチン	カルボプラチン	5	AUC	1時間	day1	点滴静注		中等度	
93	CBDCA + PEM(中皮腫)	アリムタ	ペメトレキセドナトリウム水和物	500	mg/m ²	10分	day1	点滴静注	3週	軽度	進行・再発 放射線化学療法
		カルボプラチン	カルボプラチン	6	AUC	1時間	day1	点滴静注		中等度	
80	CDDP + GEM(中皮腫)	ゲムシタビン	ゲムシタビン塩酸塩	1000	mg/m ²	30分	day1,8	点滴静注	3週	軽度	進行・再発
		シスプラチン	シスプラチン	80	mg/m ²	1時間	day1	点滴静注		高度	
91	CDDP + PEM(中皮腫)	アリムタ	ペメトレキセドナトリウム水和物	500	mg/m ²	10分	day1	点滴静注	3週	軽度	進行・再発 術後
		シスプラチン	シスプラチン	75	mg/m ²	1時間	day1	点滴静注		高度	
737	GEM(q3w/中皮腫)	ゲムシタビン	ゲムシタビン塩酸塩	1000	mg/m ²	30分	day1,8	点滴静注	3週	軽度	進行・再発
213	GEM(q4w/中皮腫)	ゲムシタビン	ゲムシタビン塩酸塩	1000	mg/m ²	30分	day1,8,15	点滴静注	4週	軽度	進行・再発
809	Nivolumab(q2W/中皮腫)	オプジーボ	ニボルマブ(遺伝子組換え)	240	mg/body	1時間	day1	点滴静注	2週	最小度	進行・再発
912	Nivolumab(q 4 W/中皮腫)	オプジーボ	ニボルマブ(遺伝子組換え)	480	mg/body	1時間	day1	点滴静注	4週	最小度	進行・再発
436	PEM(中皮腫)	アリムタ	ペメトレキセドナトリウム水和物	500	mg/m ²	10分	day1	点滴静注	3週	軽度	進行・再発