

No	レジメン名	薬剤名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間	催吐リスク	適応分類
519	AMR(SCLC)	カルセド	アムルピシン塩酸塩	40	mg/m <sup>2</sup>	5分	day1-3	点滴静注	3週	中等度	進行・再発
830	Atezolizumab(maintenance) (SCLC)	テセントリク	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	1200	mg/body	30-60分	day1	点滴静注	3週	最小度	進行・再発
155	CBDCA + CPT-11(SCLC)	イリノテカン カルボプラチン	イリノテカン塩酸塩水和物	60	mg/m <sup>2</sup>	1時間30分	day1,8,15	点滴静注	4週	中等度	進行・再発
			カルボプラチン	6	AUC	1時間	day1	点滴静注		中等度	
933	CBDCA+VP-16(SCLC)	ラステット カルボプラチン	エトポシド	100	mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1-3	点滴静注	3週	最小度	進行・再発
			カルボプラチン	5	AUC	1時間	day1	点滴静注		中等度	
827	CBDCA + VP-16+Atezolizumab	ラステット カルボプラチン テセントリク	エトポシド	100	mg/m <sup>2</sup>	30分	day1-3	点滴静注	3週	最小度	進行・再発
			カルボプラチン	5	AUC	1時間30分	day1	点滴静注		中等度	
			アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	1200	mg/body	30-60分	day1	点滴静注		最小度	
893	CBDCA+VP-16+Durvalumab	カルボプラチン ラステット イミフィンジ	カルボプラチン	5-6	AUC	1時間	day1	点滴静注	3週	中等度	進行・再発
			エトポシド	80-100	mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1-3	点滴静注		最小度	
			デュルバルマブ(遺伝子組換え)	1500	mg/body	1時間	day1	点滴静注		最小度	
894	Durvalumab(maintenance)	イミフィンジ	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	1500	mg/body	1時間	day1	点滴静注	4週	最小度	進行・再発
74	CDDP + CPT-11(SCLC)	イリノテカン シスプラチン	イリノテカン塩酸塩水和物	60	mg/m <sup>2</sup>	90分	day1,8,15	点滴静注	4週	中等度	進行・再発 術後
			シスプラチン	60	mg/m <sup>2</sup>	1時間	day1	点滴静注		高度	
88	CDDP + VP-16(SCLC)	ラステット シスプラチン	エトポシド	100	mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1-3	点滴静注	3週	最小度	進行・再発 術後
			シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	1時間	day1	点滴静注		高度	
465	CDDP+VP-16(分割)	シスプラチン ラステット	シスプラチン	25	mg/m <sup>2</sup>	1時間	day1-3	点滴静注	3週	高度	進行・再発
			エトポシド	80	mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1-3	点滴静注		最小度	
934	CDDP+VP-16 + Durvalumab(SCLC)	シスプラチン ラステット イミフィンジ	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	1時間	day1	点滴静注	3週	高度	進行・再発
			エトポシド	100	mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1-3	点滴静注		最小度	
			デュルバルマブ(遺伝子組換え)	1500	mg/body	1時間	day1	点滴静注		最小度	
517	CDDP + VP-16 + RT(SCLC)	ラステット シスプラチン	エトポシド	100	mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1-3	点滴静注	4週	最小度	進行・再発 術後 放射線化学療
			シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	1時間	day1	点滴静注		高度	
738	CPT-11(q3w/SCLC)	イリノテカン	イリノテカン塩酸塩水和物	100	mg/m <sup>2</sup>	90分以上	day1,8	点滴静注	3週	中等度	進行・再発
101	CPT-11(q4w/SCLC)	イリノテカン	イリノテカン塩酸塩水和物	100	mg/m <sup>2</sup>	90分以上	day1,8,15	点滴静注	4週	中等度	進行・再発
452	NGT(SCLC)	ハイカムチン	ノギテカン塩酸塩	1	mg/m <sup>2</sup>	30分	day1-5	点滴静注	3週	軽度	進行・再発