

申請科	レジメン番号	レジメン名	休業期間(日)	総コース数	使用薬剤	投与経路	用量	投与時間 間隔	投与日	備考
外科	16-27-001	FEC100	21	6コース	シクロホスファミド エビルピシン フルオロウラシル	点滴静注 点滴静注 点滴静注	500 mg /m2 100 mg /m2 500 mg /m2	30min 15min 全開	d1 d1 d1	60-100mg/m2
外科	16-27-007	CMF-iv	28	6コース	シクロホスファミド メトレキサート フルオロウラシル	点滴静注 点滴静注 静注	600 mg /m2 40 mg /m2 600 mg /m2	30min 15min 全開	d1,(8) d1,(8) d1,(8)	
外科	16-27-008	CMF	28	6コース	フルオロウラシル メトレキサート シクロホスファミド	静注 点滴静注 内服	600 mg /m2 40 mg /m2 100 mg /b	全開 15min	d1,8 d1,8 d1-14	
外科	16-27-011	AT	21	6コース	ドセタキセル ドキシソルピシン	点滴静注 点滴静注	60 mg /m2 50 mg /m2	60-90min 全開	d1 d1	90
外科	16-27-018	ナベルピン単剤	21		ビノレルピン	点滴静注	25 mg /m2	7min	d1,8	
外科	16-27-020	ハーセプチン/ゼローダ	28	PDまで	トラスツズマブ トラスツズマブ トラスツズマブ カベシタピン	点滴静注 点滴静注 点滴静注 内服	4 mg /kg 2 mg /kg 2 mg /kg 2400 mg /b	90min以上 90min以上 90min以上 分2	d1 d8,15,(22) d1,8,15,(22) d1-21	1コース目 1コース目 2コース目以降 1800or2400mg/b
外科	16-27-021	タキソテール/ゼローダ	21	PDまで	ドセタキセル カベシタピン	点滴静注 内服	60 mg /m2 2400 mg /b	60-90min 分2	d1 d1-14	mg/bの記載もあり 1800or2400mg/b
外科	16-27-024	weekly PTX	56		パクリタキセル	点滴静注	80 mg /m2	60-90min	d1,8,15,22,29,36	
外科	16-27-025	weekly PTX(q4ws)	28		パクリタキセル	点滴静注	80 mg /m2	60-90min	d1,8,15	
外科	16-27-026	ハーセプチン	21		トラスツズマブ トラスツズマブ	点滴静注 点滴静注	8 mg /kg 6 mg /kg	3hr 2hr	d1 d1	初回 2回目以降
外科	16-27-032	ドセタキセル、エンドキサン併用	21	4コース以上	ドセタキセル シクロホスファミド	点滴静注 点滴静注	75 mg /m2 600 mg /m2	60-90min 30min	d1 d1	
外科	16-27-035	ハーセプチン(初回4mg/kg 2回目以降2mg/kg)	7	規定なし	トラスツズマブ トラスツズマブ	点滴静注 点滴静注	4 mg /kg 2 mg /kg	1hr 1hr	d1 d1	初回 2回目以降
外科	16-27-037	エンドキサン+ゼローダ併用	28	PDまで	シクロホスファミド カベシタピン	点滴静注 内服	600 mg /m2 2400 mg /b	30min 分2	d1 d1-21	1800-2400mg/b
外科	16-27-038	アブラキサン(単剤)	21	規定なし	ナブパクリタキセル	点滴静注	260 mg /m2	30min	d1	
外科	16-27-044	ハーセプチン(高用量)+ゼローダ併用療法	21	PDまで	トラスツズマブ トラスツズマブ カベシタピン	点滴静注 点滴静注 内服	8 mg /kg 6 mg /kg 4800 mg /b	30-90min 30-90min 分2	d1 d1 d1-14	初回 2回目以降 3000-4800mg/b
外科	16-27-045	アバステン+パクリタキセル	28	規定なし	パクリタキセル ペバシズマブ	点滴静注 点滴静注	90 mg /m2 10 mg /kg	50-60min ※	d1,8,15 d1,15	60-90mg/m2 ※①90min②60min③30min
外科	16-27-046	ドセタキセル単剤療法	21	術後補助療法:4-6コース 転移・再発:規定なし	ドセタキセル	点滴静注	100 mg /m2	1-2hr	d1	60-100mg/m2
外科	16-27-047	Eribulin(ハラヴェン®)	21	PDまで	エリブリン	点滴静注	1.4 mg /m2	2-5min	d1,8	
外科	16-27-049	アドリアシン+エンドキサン併用療法	21	DXRの累積投与量500mg/m2まで	ドキシソルピシン シクロホスファミド	点滴静注 点滴静注	60 mg /m2 600 mg /m2	20-30min 30-40min	d1 d1	
外科	16-27-052	ハーセプチン(高用量)+ゼローダ(A法)併用療法	28	PDまで	トラスツズマブ トラスツズマブ カベシタピン	点滴静注 点滴静注 内服	8 mg /kg 6 mg /kg 3000 mg /b	30-90min 30-90min 分2	d1 d1 d1-21	初回休業期間:トラスツズマブは21日、カベシタピンは28日 2回目以降 1800-3000mg/b
外科	16-27-053	パクリタキセル+ジェムザール併用療法	21	PDまで	ゲムシタピン パクリタキセル	点滴静注 点滴静注	1250 mg /m2 175 mg /m2	30min 60-90min	d1,8 d1	
外科	16-27-054	ジェムザール	21	PDまで	ゲムシタピン	点滴静注	1000 mg /m2	30min	d1,8	
外科	16-27-055	EC	21	4-6コース	エビルピシン シクロホスファミド	点滴静注 点滴静注	60 mg /m2 600 mg /m2	10min 30min	d1 d1	
外科	16-27-056	ハーセプチン+TS-1	42	PDまで	トラスツズマブ S1	点滴静注 内服	2 mg /kg 120 mg /b	60-90min 分2	d1,8,15,22,29,36 d1-28	100-120mg/b
外科	16-27-057	ハーセプチン(triweekly,初回8mg/kg)+EC	21	4-6コース	トラスツズマブ エビルピシン シクロホスファミド	点滴静注 点滴静注 点滴静注	8 mg /kg 60 mg /m2 600 mg /m2	90min以上 10min 30min	d1 d1 d1	
外科	16-27-058	ハーセプチン(triweekly,2回目以降6mg/kg)+EC	21	4-6コース	トラスツズマブ エビルピシン シクロホスファミド	点滴静注 点滴静注 点滴静注	6 mg /kg 60 mg /m2 600 mg /m2	30min以上 10min 30min	d1 d1 d1	
外科	16-27-059	ハーセプチン(triweekly,初回8mg/kg)+ジェムザール	21	規定なし	ゲムシタピン トラスツズマブ	点滴静注 点滴静注	1250 mg /m2 8 mg /kg	30min 90min以上	d1,8 d1	
外科	16-27-060	ハーセプチン(triweekly,2回目以降6mg/kg)+ジェムザール	21	規定なし	ゲムシタピン トラスツズマブ	点滴静注 点滴静注	1250 mg /m2 6 mg /kg	30min 30min以上	d1,8 d1	
外科	16-27-061	ハーセプチン(triweekly,初回8mg/kg)+TC	21	4コース以上	トラスツズマブ ドセタキセル シクロホスファミド	点滴静注 点滴静注 点滴静注	8 mg /kg 75 mg /m2 600 mg /m2	90min以上 1hr以上 30min	d1 d1 d1	

申請科	レジメン番号	レジメン名	休業期間(日)	総コース数	使用薬剤	投与経路	用量	投与時間 間隔	投与日	備考
外科	16-27-062	ハーセプチン(triweekly,2回目を降6mg/kg)+TC	21	4コース以上	トラスツズマブ ドセタキセル シクロホスファミド	点滴静注 点滴静注 点滴静注	6 mg /kg 75 mg /m2 600 mg /m2	30min以上 1hr以上 30min	d1 d1 d1	
外科	16-27-063	ハーセプチン(triweekly,初回8mg/kg)+ナベルピン	21	規定なし	ビノレルピン トラスツズマブ	点滴静注 点滴静注	25 mg /m2 8 mg /kg	5min 90min以上	d1,8 d1	
外科	16-27-064	ハーセプチン(triweekly,2回目を降6mg/kg)+ナベルピン	21	規定なし	ビノレルピン トラスツズマブ	点滴静注 点滴静注	25 mg /m2 6 mg /kg	5min 30min以上	d1,8 d1	
外科	16-27-065	ハーセプチン(triweekly,2回目を降6mg/kg)+CMF	28	規定なし	メトトレキサート フルオロウラシル トラスツズマブ シクロホスファミド	点滴静注 点滴静注 点滴静注 内服	40 mg /m2 600 mg /m2 6 mg /kg 100 mg /b	15min 15min 30min以上	d1,8 d1,8 d1 d1-14	トラスツズマブは21日CMFは28日
外科	16-27-066	ハーセプチン(triweekly,初回8mg/kg)+CMF-iv	28	規定なし	シクロホスファミド メトトレキサート フルオロウラシル トラスツズマブ	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	600 mg /m2 40 mg /m2 600 mg /m2 8 mg /kg	30min 15min 15min 90min以上	d1,(8) d1,(8) d1,(8) d1	トラスツズマブは21日CMF-ivは21-28日
外科	16-27-067	ハーセプチン(triweekly,2回目を降6mg/kg)+CMF-iv	28	規定なし	シクロホスファミド メトトレキサート フルオロウラシル トラスツズマブ	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	600 mg /m2 40 mg /m2 600 mg /m2 6 mg /kg	30min 15min 15min 30min以上	d1,(8) d1,(8) d1,(8) d1	トラスツズマブは21日CMF-ivは21-28日
外科	16-27-068	ハーセプチン(triweekly,初回8mg/kg),パクリタキセル,ジェムザール	21	規定なし	ゲムシタピン トラスツズマブ パクリタキセル	点滴静注 点滴静注 点滴静注	1250 mg /m2 8 mg /kg 175 mg /m2	30min 90min以上 60-90min	d1,8 d1 d1	
外科	16-27-069	ハーセプチン(triweekly,2回目を降6mg/kg),パクリタキセル,ジェムザール	21	規定なし	ゲムシタピン トラスツズマブ パクリタキセル	点滴静注 点滴静注 点滴静注	1250 mg /m2 6 mg /kg 175 mg /m2	30min 30min以上 60-90min	d1,8 d1 d1	
外科	16-27-070	ハーセプチン(triweekly,初回8mg/kg)+ハラヴエン	21	規定なし	エリブリン トラスツズマブ	点滴静注 点滴静注	1.4 mg /m2 8 mg /kg	2-5min 90min以上	d1,8 d1	
外科	16-27-071	ハーセプチン(triweekly,2回目を降6mg/kg)+ハラヴエン	21	規定なし	エリブリン トラスツズマブ	点滴静注 点滴静注	1.4 mg /m2 6 mg /kg	2-5min 30min以上	d1,8 d1	
外科	16-27-072	ハーセプチン(weekly,初回4mg/kg)+パクリタキセル	7	規定なし	トラスツズマブ パクリタキセル	点滴静注 点滴静注	4 mg /kg 80 mg /m2	90min以上 60-90min	d1 d1	
外科	16-27-073	ハーセプチン(weekly,2回目を降2mg/kg)+パクリタキセル	28	規定なし	トラスツズマブ パクリタキセル	点滴静注 点滴静注	2 mg /kg 80 mg /m2	30min以上 60-90min	d1,8,15,22 d1,8,15	
外科	16-27-074	ハーセプチン(triweekly,初回8mg/kg)+パクリタキセル	21	規定なし	パクリタキセル トラスツズマブ	点滴静注 点滴静注	80 mg /m2 8 mg /kg	60-90min 90min以上	d1,8,15 d1	
外科	16-27-075	ハーセプチン(triweekly,2回目を降6mg/kg)+パクリタキセル	21	規定なし	パクリタキセル トラスツズマブ	点滴静注 点滴静注	80 mg /m2 6 mg /kg	30min 30min以上	d1,8,15 d1	q4w q3w
外科	16-27-076	ハーセプチン(triweekly,初回8mg/kg)+ドセタキセル	21	術後補助療法:4-6コース転移・再発:規定なし	トラスツズマブ ドセタキセル	点滴静注 点滴静注	8 mg /kg 100 mg /m2	90min以上 1-2hr	d1 d1	60-100mg/m2
外科	16-27-077	ハーセプチン(triweekly,2回目を降6mg/kg)+ドセタキセル	21	術後補助療法:4-6コース転移・再発:規定なし	トラスツズマブ ドセタキセル	点滴静注 点滴静注	6 mg /kg 100 mg /m2	30min以上 1-2hr	d1 d1	60-100mg/m2
外科	16-27-078	ハーセプチン(triweekly,初回8mg/kg)+アブラキササン	21	PDまで	トラスツズマブ ナブパクリタキセル	点滴静注 点滴静注	8 mg /kg 260 mg /m2	90min 30min	d1 d1	
外科	16-27-079	ハーセプチン(triweekly,2回目を降6mg/kg)+アブラキササン	21	規定なし	トラスツズマブ ナブパクリタキセル	点滴静注 点滴静注	6 mg /kg 260 mg /m2	30min以上 30min	d1 d1	
外科	16-27-080	ハーセプチン(triweekly,初回8mg/kg)+CMF	28	規定なし	メトトレキサート フルオロウラシル トラスツズマブ シクロホスファミド	点滴静注 点滴静注 点滴静注 内服	40 mg /m2 600 mg /m2 8 mg /kg 100 mg /b	15min 15min 90min以上	d1,8 d1,8 d1 d1-14	HER21 CMF28
外科	16-27-081	ジェムザール	21	PDまで	ゲムシタピン	点滴静注	1250 mg /m2	30min	d1,8	
外科	16-27-082	HP療法(tri,初回ハーセプチン8mg/kg,パージェタ840mg/body)+ドセタキセル	21	規定なし	ベルツズマブ トラスツズマブ ドセタキセル	点滴静注 点滴静注 点滴静注	840 mg /b 8 mg /kg 75 mg /m2	1hr 90min 1hr	d1 d1 d1	
外科	16-27-083	HP療法(tri,2回目ハーセプチン8mg/kg,パージェタ420mg/body)+ドセタキセル	21	規定なし	ベルツズマブ トラスツズマブ ドセタキセル	点滴静注 点滴静注 点滴静注	420 mg /b 6 mg /kg 75 mg /m2	30min 30min 1hr	d1 d1 d1	
外科	16-27-084	カドサイラ	21	規定なし	トラスツズマブ エムタンシン	点滴静注	3.6 mg /kg	90min	d1	90min(2回目を以降は30minも可)
外科	16-27-085	HP療法(tri,初回HER8mg/kg,PER840mg/body)+eribulin	21	PDまで	エリブリン ベルツズマブ トラスツズマブ	点滴静注 点滴静注 点滴静注	1.4 mg /m2 840 mg /b 8 mg /kg	全開 1hr 90min	d1,8 d1 d1	

申請科	レジメン番号	レジメン名	休業期間 (日)	総コース数	使用薬剤	投与経路	用量	投与時間 間隔	投与日	備考
外科	16-27-086	HP療法(tri,2回目~HER8mg/kg,PER420mg/body)+eribulin	21	PDまで	エリブリン	点滴静注	1.4 mg /m2	全開	d1,8	
					ベルツズマブ	点滴静注	420 mg /b	30min	d1	
					トラスツズマブ	点滴静注	6 mg /kg	30min	d1	
外科	16-27-087	HP療法+パクリタキセル(1コース目)	42	1コース	ベルツズマブ	点滴静注	840 mg /b	1hr	d1	
					トラスツズマブ	点滴静注	8 mg /kg	90min	d1	
					ベルツズマブ	点滴静注	420 mg /b	30min	d22	
					トラスツズマブ	点滴静注	6 mg /kg	30min	d22	
					パクリタキセル	点滴静注	80 mg /m2	1hr	d1,8,15,22,29	
外科	16-27-088	HP療法+パクリタキセル(2コース目以降)	42		ベルツズマブ	点滴静注	420 mg /b	30min	d1,22	
					トラスツズマブ	点滴静注	6 mg /kg	30min	d1,22	
					パクリタキセル	点滴静注	80 mg /m2	1hr	d1,8,15,22,29	
外科	16-27-089	HP+PTX(初回量:HER8mg/kg,PER840mg/body)	21	術前・術後補助化学療法.PTXは4コース、HPIは投与開始から1年間	ベルツズマブ	点滴静注	840 mg /b	1hr	d1	
					トラスツズマブ	点滴静注	8 mg /kg	90min	d1	
					パクリタキセル	点滴静注	80 mg /m2	1hr	d1,8,15	
外科	16-27-090	HP+PTX(2回目以降:HER8mg/kg,PER420mg/body)	21	術前・術後補助化学療法.PTXは4コース、HPIは投与開始から1年間	ベルツズマブ	点滴静注	420 mg /b	30min	d1	
					トラスツズマブ	点滴静注	6 mg /kg	30min	d1	
					パクリタキセル	点滴静注	80 mg /m2	1hr	d1,8,15	
外科	16-27-091	HP維持療法(初回量:HER8mg/kg,PER840mg/body)	21	術前・術後補助化学療法において通算12ヶ月まで	ベルツズマブ	点滴静注	840 mg /b	1hr	d1	
					トラスツズマブ	点滴静注	8 mg /kg	90min	d1	
外科	16-27-092	HP維持療法(2回目以降:HER8mg/kg,PER420mg/body)	21	術前・術後補助化学療法において通算12ヶ月まで	ベルツズマブ	点滴静注	420 mg /b	30min	d1	
					トラスツズマブ	点滴静注	6 mg /kg	30min	d1	
外科	16-27-093	カルボプラチン+パクリタキセル	21	6コース	パクリタキセル	点滴静注	175 mg /m2	3hr	d1	
					カルボプラチン	点滴静注	6 (AUC)	1hr	d1	
外科	16-27-094	CBDCA/GEM+Pem	21	PDまで(pembroは最大35回)	ゲムシタピン	点滴静注	1000 mg /m2	30min	d1,8	
					カルボプラチン	点滴静注	2 (AUC)	1hr	d1,8	
					ペムプロリズマブ	点滴静注	200 mg /b	30min	d1	
外科	16-27-095	nab-PTX+Pem	28	PDまで(pembroは最大35回)	ナブパクリタキセル	点滴静注	100 mg /m2	30min	d1,8,15	q4w
					ペムプロリズマブ	点滴静注	200 mg /b	30min	d1	q3w
外科	16-27-096	PTX+Pem	28	PDまで(pembroは最大35回)	パクリタキセル	点滴静注	90 mg /m2	1hr	d1,8,15	ペムプロリズマブは21パクリタキセルは28
					ペムプロリズマブ	点滴静注	200 mg /b	30min	d1	
外科	16-27-097	Trastuzumab Deruxtecan(T-DXd)	21	PDまで	トラスツズマブ デルクステカン	点滴静注	5.4 mg /kg	90min	d1	90min(忍容性良ければ2回目以降30min)
外科	16-27-098	nab-PTX+Atezo	28	PDまで	ナブパクリタキセル	点滴静注	100 mg /m2	30min	d1,8,15	
					アテゾリズマブ	点滴静注	840 mg /b	1hr	d1,15	60min(忍容性良ければ2回目以降30min)