

## 【医療連携予約患者用】

## 消化器内視鏡における抗血栓薬(抗血小板作用薬・抗凝固薬)の取り扱い指針

[他の医療機関からのご予約で検査を受けられる方は、慎重を期すためこの運用での休薬をお願いしています。]

## ■ 医療連携予約の内視鏡検査について

## ハイリスク症例

- (1) 休薬せずに内視鏡検査を行ない、病変の有無を診断する(ただし生検は施行しないので、その旨を内鏡検査同意書取得時に患者に説明する)。
- (2) もし、生検が必要な病変が見つかった場合は、入院のうえ抗血栓薬をヘパリンに置換して再度内視鏡検査を施行し生検を行う。(休薬説明同意書が必須)  
詳細は『抗凝固薬・抗血小板作用薬の休薬、周術期使用、再開に関する指針』の“周術期使用”を参照。

## ローリスク症例

- (1) 下記表に従い休薬し、生検を行う。休薬説明同意書を取得することが望ましい。
- (2) 生検を行わなかった場合は、検査終了後に内服を再開する。

## 抗血小板薬

一般名	商品名	検査前休薬期間	生検後休薬期間
アスピリン	バイアスピリン、バファリン、アスピリン末	3日間	生検当日のみ休薬・翌日再開
シロスタゾール	プレタール	3日間	〃
EPA	エパデールS	3日間	〃
オメガ-3脂肪酸エチル	ロトリガ	3日間	〃
クロピドグレル硫酸塩	ブラビックス	5日間	〃
プラスグレル塩酸塩	エフィエント	5日間	〃
チクロピジン	パナルジン	5日間	〃
アスピリン+チクロピジン		7日間	〃

## 抗凝固薬

ワルファリン	ワーファリン	4日間	生検当日のみ休薬・翌日再開
ダビガトランエテキシラートメタンサルホン酸塩製剤	プラザキサ	[e-GFR 36 以上] 24時間前 [e-GFR 21.6~36] 48時間前	〃
リバーロキサバン	イグザレルト	24時間前	〃
アピキサバン	エリクセス	24時間前	〃
エドキサバントシル酸水和物	リクシアナ	24時間前	〃

## その他

ベラプロストナトリウム	ドルナー、プロサイリン、ベラサスLA	検査当日のみ休薬して来院	生検当日のみ休薬・翌日再開
サルボグレラート塩酸塩	アンブラーク	〃	〃
リマプロストアルフアデクス	リマプロストアルフアデクス	〃	〃
ジピリダモール	ベルサンチン、ベルサンチンL、アンギナール	〃	〃
ジラゼブ塩酸塩	コメリアンコーワ	〃	〃
トラピジル	ロコルナール	〃	〃
イブジラスト	ケタス	〃	〃
イフェンプロジル酒石酸塩	セロクラール	〃	〃

※休薬期間とは、検査当日を含まない日数を示す。休薬期間3日間＝検査日の前日3日間の休薬が必要

※併用療法の休薬については、主治医もしくは専門医の判断により決定する。